

2012年1月（記載要領変更に伴う改訂）

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

第2類
医薬品

目のかすみ、かゆみに バラードE50

ビタミンE・イプロソルアミノカプロン酸配合

バラードE50は、末梢血管の血行を改善して栄養補給を助ける天然型ビタミンEや抗ヒスタミン剤のクロルフェニラミンマレイン酸塩など6種類の有効成分を配合。目のかすみ、かゆみに効果を発揮し、スッキリとした清涼感が目に広がります。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)次の症状のある人。

はげしい目の痛み

- (4)次の診断を受けた人。
　　緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

〔用法・用量〕

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。

〔効能・効果〕

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのたまり）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）。

〔成分・分量〕

成 分	分 量 (100mL中)	は たら き
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	50mg	抗酸化作用、血行促進作用により、目のかすみ、目の疲れを改善します。
イプロソルアミノカプロン酸	1000mg	抗アレルギー作用・抗炎症作用により、紫外線による眼炎や眼瞼炎の炎症を鎮め、また目のかすみを抑えます。
コンドロイシン硫酸エチルナトリウム	100mg	角膜の乾燥を防止し、目のうるおいを保ちます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	3mg	毛様体筋に作用して、目の調節機能を高め、目の疲れ、かすみ目を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性の目のかすみ・炎症を抑えます。
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、目の充血を取り除きます。

添加物：ホウ酸、クエン酸、パラベン、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、 ℓ -メントール

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、配置期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼやティッシュ等で軽くふき取って使用してください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室 ☎939-3542 富山県富山市水橋開発277番10
電話：076-478-5580 受付時間：9:00～16:00（土、日、祝祭日を除く）

製造販売元 **TOA 東亜薬品株式会社**
富山県富山市水橋開発277番10

04(50845)