

肩こり・腰痛・五十肩・神経痛 眼精疲労などの緩和に

ビタミンB₁主薬製剤

マイラックミン[®]エースゴールド

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム配合
グルコサミン塩酸塩(緩衝剤)

特 徴

1. ビタミンB₁、B₂、B₆、B₁₂のビタミンB群は、糖質、脂質、アミノ酸、蛋白質、脂肪酸に広く関与する他、神経機能の改善・修復など神経・筋肉に作用し、疲労や痛みを取り除きます。
2. これに血流を良くするビタミンEと、骨、関節、皮ふ、眼の成分であるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを加えることにより、不快な関節痛（肩こり、腰痛、五十肩）や神経痛、手足のしびれ、眼精疲労などの改善や肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時に役立ちます。
また、緩衝剤としてグルコサミン塩酸塩を配合しています。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法及び用量

次の量を、1日3回朝昼晩服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1～2 カプセル	3 回
7歳以上15歳未満	1 カプセル	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

成 分	1日量（6カプセル中）	作 用
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900.0mg	神経・腰・関節の痛み、肩こりや目の疲れをやわらげます。
ベンフォチアミン(ビタミンB ₁ 誘導体)	138.3mg	神経や筋肉の機能維持に働きます。
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂)	12.0mg	糖質、脂質、蛋白質等の生体内代謝に広く関与します。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	50.0mg	アミノ酸・蛋白質の分解・生合成や、脂肪の代謝に関与します。
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	60.0μg	末梢神経の修復に関与し、神経や関節の痛みを改善します。
酢酸d-α-トコフェロール(ビタミンE)	100.0mg	血管系に作用し、血流を良くします。

添加物として、グルコサミン塩酸塩、ゼラチン、D-マンニトール、バレイショデンプン、ステアリン酸Mg、ラウリル硫酸Na、その他4成分を含有します。

※本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂（リボフラビン酪酸エステル）によるもので、心配はありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限（外箱及び容器に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。
- (4) 開封後は、すみやかに服用してください。
- (5) 水分がカプセルに付きますと内容成分の変質の原因となりますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。また、本品は吸湿性が高いため、服用のつど、フタをよく閉めてください。
- (6) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック(株) お客様相談窓口 076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）