

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	解熱鎮痛薬
承認販売名	
製品名	快精カプセル
製品名（読み）	カイセイカプセル
製品の特徴	<p>◆通常の鎮痛成分のほか、漢方薬でよく用いられるカンゾウ（甘草）、シャクヤク（芍薬）が配合されています。</p> <p>◆腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛などいろいろな痛みに対し、有効に働きます。</p> <p>◆1日1回3カプセルの服用で、効果的な作用を発揮します。</p>
使用上の注意	<p>■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）</p> <p>1.次の人は服用しないで下さい。</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗り物酔い薬</p> <p>3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。</p> <p>4.服用前後は飲酒をしないで下さい。</p> <p>5.長期連用しないで下さい。</p> <p>■相談すること</p> <p>1.次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p> <p>(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。</p> <p>(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(3)高齢者。</p> <p>(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(5)次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍</p> <p>2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p> <p>〔関係部位：症状〕 皮膚：発疹・発赤、かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振 精神神経系：めまい その他：過度の体温低下</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。</p> <p>〔症状の名称：症状〕 ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する 中毒性表皮壊死融解症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する 急性汎発性発疹性膿疱症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する 肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる 腎障害：発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢</p>

	<p>等があらわれる 間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする 偽アルドステロン症：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる</p> <p>3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 眠気</p> <p>4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p>																		
効能・効果	<p>1) 腰痛・関節痛・筋肉痛・肩こり痛・神経痛・打撲痛・骨折痛・捻挫痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛</p> <p>2) 悪寒・発熱時の解熱</p>																		
効能関連注意																			
用法・用量	<p>[年令：1回量] 15才以上：3カプセル 11～14才：2カプセル</p> <p>前記1回量を1日1回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。</p>																		
用法関連注意	<ul style="list-style-type: none"> ●お子さまに服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。 ●用法及び用量をお守り下さい。 ●11才未満のお子さまには服用させないで下さい。 																		
成分分量	<p>3カプセル中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シャクヤクエキス</td> <td>50mg</td> <td>(芍薬500mg)</td> </tr> <tr> <td>カンゾウエキス</td> <td>125mg</td> <td>(甘草500mg)</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>300mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アリルイソプロピルアセチル尿素</td> <td>60mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>50mg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	内訳	シャクヤクエキス	50mg	(芍薬500mg)	カンゾウエキス	125mg	(甘草500mg)	アセトアミノフェン	300mg		アリルイソプロピルアセチル尿素	60mg		無水カフェイン	50mg	
成分	分量	内訳																	
シャクヤクエキス	50mg	(芍薬500mg)																	
カンゾウエキス	125mg	(甘草500mg)																	
アセトアミノフェン	300mg																		
アリルイソプロピルアセチル尿素	60mg																		
無水カフェイン	50mg																		
添加物	セルロース、バレイショデンプン、カルメロースカルシウム、青色1号、赤色3号、ラウリル硫酸ナトリウム、ゼラチン																		
保管及び取扱い上の注意	<p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。</p> <p>(2) お子さまの手の届かない所に保管して下さい。</p> <p>(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)</p> <p>(4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。</p>																		
消費者相談窓口	<p>会社名：株式会社廣昌堂 住所：富山県射水市水戸田2841 電話：0766-54-1007 受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）</p>																		
製造販売会社	<p>(株)廣昌堂 添付文書情報 会社名：株式会社廣昌堂 住所：富山県射水市水戸田2841</p>																		
販売会社																			
剤形	カプセル																		
リスク区分等	第「2」類医薬品																		